

CONTRAST

Collaboration for New Treatments of Acute Stroke

Welke patiënt in welke trial?

Klinische diagnose van een acuut herseninfarct
én
Proximale intracranieële occlusie in de anterieure
circulatie op CTA/MRA geschikt voor IAT

0-4.5 uur*
én
geen contra-
indicaties
voor IVT

0-4.5 uur* én
wel contra-indicaties
voor IVT
of _____
0-4.5 uur * én
reeds IVT gehad
of _____
4.5-6 uur*

6-24 uur*

MR CLEAN **N** IV

MR CLEAN **MED**

MR CLEAN **LATE**

*Aantal uur na ontstaan van symptomen/last seen well
IVT = intraveneuze trombolysie (met alteplase)

CONTRAST

Collaboration for New Treatments of Acute Stroke

Belangrijke informatie

Vóór randomisatie:

Om een patiënt te kunnen randomiseren in één van de trials is **altijd** nodig:

- Patiënt ID van het interventiecentrum, geboortedatum, geslacht, gewicht
- Geobserveerde 'stroke onset ': ja/nee
 - Ja: tijdstip van 'stroke onset'
 - Nee: tijdstip van 'last seen well', tijdstip waarop symptomen voor het eerst opgemerkt zijn
- Indien de patiënt is overgeplaatst: naam verwijzend centrum
- Tijdstip van aankomst in het interventiecentrum
- Klinisch aangedane hemisfeer: linker of rechter
- Specifieke inclusie/exclusiecriteria van de trial zelf → zie trial-specifiek zakkaartje
- Geen deelname in andere trial, m.u.v. MR ASAP

Trial specifieke webpagina's en randomisatiepagina's:

www.mrclean-noiv.nl

www.mrclean-med.nl

www.mrclean-late.nl